

**B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N
G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z**

Band 10

Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 10: 85-97 (2002)

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 15. 7. 2001
Erschienen am 31. 7. 2002

Floristische Beobachtungen 2000 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBAUER,
HANDRIJ HÄRTEL und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 2 Karten

Beobachter: P. Bauer / Mlýny, A. Beck / Beierfeld, Dr. S. Bräutigam / Görlitz, K. Diétel / Neustadt/Sachs., R. Franke / Görlitz, M. Friese / Oberförstchen, S. Fröhner / Dresden, P. Gebauer / Dürrbach, A. Golde / Freiberg, St. Hahn / Demitz-Thumitz, Dr. D. Hanspach / Ortrand, Magister H. Härtel / Prag, Prof. Dr. H.-J. Hardtke / Possendorf, Prof. Dr. W. Hempel / Großpostwitz, A. Ihl / Dresden, F. Klenke / Naundorf, D. Knaut / Dresden, St. Lubitz / Bad Muskau, M. Lust / Rožany, Dr. B. Müller / Dresden, Dr. F. Müller / Dresden, H.-W. Otto / Bischofswerda, H. Passig / Großhennersdorf, V. Piechotta / Klitten, M. Ranft / Wilsdruff, M. Reimann / Heilbronn, G. Ritschel / Šluknov, Ch. Schluckwerder / Löbau, R. Schröder / Dresden, D. Schulz / Dresden, A. Schurig / Zittau, J. Stolle / Halle, Saale, G. und M. Striese / Rietschen, D. Töppich / Ullersdorf, I. Uhlemann / Liebenau, D. Uhlig / Höckendorf, J. Vogel / Görlitz, A. Wiepning / Dresden.

Die Verbreitungskarten beruhen auf den Kartierungsergebnissen von Mitgliedern der AG Sächsischer Botaniker und der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz. Sie wurden durch Angaben tschechischer Botaniker ergänzt.

Gebietsbezeichnung: Wie bei OTTO et al. (1985, Karte 1) und OTTO et al. (1996) näher dargelegt, bedeuten BL Nordböhmen (im Bereich folgender topografischer Karten 1:25000: 4951, 4952, 5051-5053, 5150-5153, 5250), EH Elbhügelland, ES Elbsandsteingebirge, GP Großenhainer Pflege, LP Lausitzer Platte, ML Mittelsächsisches Lößlehmgebiet, NE Elster-Niederung, OE Osterzgebirge, OL Oberlausitz.

Kartensignaturen: Kreissymbol = indigene Art oder Archäophyt, Rhombus = eingebürgerter Neophyt; Sternsymbol = räumliche Unschärfe, d. h. der Fundort lässt sich nicht genau einem Viertelquadranten zuweisen; hohle Symbole = Beobachtung vor 1950; halbgefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung von 1950 bis 1989; gefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung seit 1990.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (1999): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in ČR (nach HOLUB & PROCHÁZKA 2000): C1 = kritisch gefährdet, C2 = stark gefährdet, C3 = gefährdet, C4 = seltenere, Aufmerksamkeit erfordernde Taxa.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen nach WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

- Agrostemma githago* L. - Korn-Rade **0**
OE 5047/41 Döbeln NW: Höckendorf, Scheunengelände (F. Müller, D. Uhlig).
- Alchemilla crinita* BUSER - Langhaariger Frauenmantel **1**
OL 5054/34 Zittau WNW: Hainewalde, Grabenrand im Ort (Fröhner et al.). Die Art war im gleichen Messtischblatt-Viertelquadranten im Roschertal bei Hainewalde bereits 1966 von Fröhner nachgewiesen worden. Sie ist in Sachsen nur von hier und von zwei Fundorten im Vogtland bekannt.
- Alchemilla glabra* NEYGENF. - Kahler Frauenmantel
OE 5148/34 Dippoldiswalde S: Dönschten, Bachufer (Hardtke).
- Alchemilla plicata* BUSER - Gefalteter Frauenmantel **2**
OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf (Fröhner et al.). Fundortbestätigung (1966 Fröhner).
- Alchemilla propinqua* LINDB. fil. - Verwandter Frauenmantel
EM 4948/33 Dresden-Plauen, Grünflächen am Kant-Gymnasium (Fröhner).
- Alisma gramineum* LEJ. – Grasblättriger Froschlöffel **3**
OL 4653/23 Niesky NW: Klitten-Dürrbacher Teichgebiet, in großer Menge auf Teichschlamm (Gebauer).
- Allium senescens* L. subsp. *montanum* (FR.) HOLUB **2**
EH 4746/41 Meißen NW: südöstlich von Seußlitz, Felskuppen (Ihl).
- Anchusa officinalis* L. - Gebräuchliche Ochsenzunge **V**
OE 5148/13 Dippoldiswalde S; Ulberndorf am Bahndamm (Hardtke).
Hochgelegenes Vorkommen der wärmeliebenden Art.
- Angelica archangelica* L. subsp. *archangelica* – Arznei-Engelwurz
EH 4746/41 Meißen NW: Diesbar, in der Elbaue (Klenke, Golde).
Typische Art des Röhrichts an der Elbe.
- Anthemis tinctoria* L. - Färber-Hundskamille **3**
OL 4850/23 Kamenz S: Hauswalde, Straßengraben (Otto).
EH 5048/24 Dresden SO: Kreischa, Steinbruch am Blauberg (Hardtke).
- Arctium nemorosum* LEJ. - Hain-Klette **3**
OE 5048/43 Dippoldiswalde O: Wilischgebiet bei der Teufelsmühle (Hardtke).
- Asplenium septentrionale* (L.) HOFFM. - Nördlicher Streifenfarn **3**
OE 5048/43 Dippoldiswalde O: Hirschbachtal, an Felsen (Hardtke).
- Asperula cynanchica* L. - Hügel-Meier **1**
EH 4948/41 Dresden-Plauen: Felsbänder über Felsenkellerbrauerei (Golde).
Bestätigung eines verschollen geglaubten Vorkommens.
- Astragalus arenarius* L. - Sand-Tragant **2**
OL 4652/41 Bautzen N: Hermsdorf NO, Waldweg am Südrand vom Heikbruch, mehrere Quadratmeter (Reimann).

Astrantia major L. - Große Sterndolde
EH 5049/32 Pirna W, Großsedlitzer Park (Schröder).

Berula erecta (HUDS.) COVILLE - Berle, Schmalblättriger Merk
OL 4549/34 Ruhland SSO: Hermsdorf NNW, Graben beim Schörchteich (Hahn u. Otto).
Im Oberlausitzer Tiefland war die Art bisher nur bei Köbeln (1951 Militzer) und
Reichwalde (1933 Militzer) beobachtet worden.

Bidens radiata THUILL. - Strahliger Zweizahn
OL 4752/44 Bautzen N: Burk N, trockengefallenes Ostufer der Talsperre, mehrfach mit *Bidens*
cernua, *B. tripartita*, *B. frondosa*, *Rumex maritimus* und *Polygonum lapathifolium*
(Reimann und Beck). Vierter Nachweis in der Oberlausitz (OTTO et al. 1999).

Botrychium matricarifolium (A. BRAUN ex DÖLL) W. D. J. KOCH - Ästige Mondraute 1
OL 4550/21 Laubusch, Halbinsel südöstlich vom Abschlusswehr der Flusskläranlage, 15
Exemplare, zusammen mit *Botrychium lunaria* (Stolle).

Calamagrostis stricta (TIMM) KOELER - Moor-Reitgras 2
OL 4555/33 Niesky NNO: mooriges Dünenal nordwestlich vom Schloß Niederspree (Golde).

Camelina microcarpa ANDRZ. ex DC - Kleinfüchtiger Leindotter 1
OE 5148/12 Dippoldiswalde SO: Niederfrauendorf, Straßenhang (Hardtke).

Carex appropinquata SCHUMACH. - Schwarzschof-Segge 1
OL 5054/41 Zittau NW: Niederoderwitz, feuchte Wiese an der Herwigsdorfer Straße (Schurig,
confirm. Gebauer). Vermutlich Fundortbestätigung: Ober-Herwigsdorf, 1936
Mießler - GLM).

Carex caryophyllea LATOURR. - Frühlings-Segge 2
OL 4954/12 Löbau, Ostseite vom Löbauer Berg (Schluckwerder).

Carex disticha HUDS. - Zweizeilige Segge 3
OL 5154/24 Zittau S, Wiese nördlich Whs. Drei Linden (Ihl).

Carex elongata L. - Langährige Segge
OE 5947/43 Freital SW: Waldsumpf am Berlasbach (Hardtke).
Im Osterzgebirge seltene Art, nur 5 Vorkommen.

Carex flacca SCHREB. - Blaugüne Segge 3
GP 4747/33 Meißen NO: Tongrube Gäversitzer Heide (F. Müller).

Carex lepidocarpa TAUSCH - Schuppenfrüchtige Gelb-Segge 2
OL 5054/32 Zittau NW: Niederoderwitz, wenige Exemplare in Umgebung der Kläranlage
(Schurig, confirm. Gebauer).

Carex montana L. - Berg-Segge 1
OL 4852/12 Bautzen WSW: Oberförstchen, Gartenland (Friese).

Carex pilosa SCOP. - Wimper-Segge
OL 4951/41 Neustadt/Sachs. O: Langburkersdorf, frischer Mischwald am Südfuß vom Hohen
Hahn, etwa 400 m² (1999 Hahn).

Einziges aktuelles Vorkommen in Sachsen.

Carex pseudobrizoides CLAUD - Reichenbachs Zittergras-Segge **3**
OL 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde-Zieglertal, auf 100 m Länge an der Böschung eines
Wiesengrabens am Wanderweg zum Bieleboh, 310 - 315 m ü. NN (Reimann).
Höchstgelegenes Vorkommen in der Oberlausitz.
Fundortbestätigung (1938 Militzer u. Schütze).

Carex pulicaris L. - Floh-Segge **1**
OE 5248/11 Altenberg NW: Bärenfels, Wiesen an der Mühle (Uhlig, F. Müller).

Corrigiola litoralis L. – Hirschsprung **3**
OL 4555/41 Bad Muskau SO: Klein Priebus WSW, Feuerlöschteich-Ufer (Golde).

Corydalis solida (L.) CLAIRV. - Gefingerter Lerchensporn **3**
OL 4953/41 Bautzen S: Sohland/Spree, Wiese (Friese).

Cynoglossum officinale L. - Echte Ochsenzunge
EH 4947/11 Meißen O: Röhrsdorf, in der Dorfflur (Klenke).

Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT & SUMMERH. - Breitblättriges Knabenkraut **2; C3**
BL 5052/23 Rumburk W: Brtníky / Zeidler, Wiesen westlich vom Ptačí vrch / Lichtenberg
(Bauer, Härtel et al.).
OE 5148/13 Dippoldiswalde S, Talwiese bei Obercarsdorf (Hardtke). Flächennaturdenkmal mit
großer Population.
OE 5148/13 Dippoldiswalde S, Nebental der Weißeritz bei Ulberndorf (Hardtke). Von dem
ehemals großen Vorkommen durch Überweidung nur noch 3 Exemplare
vorhanden.

Dryopteris expansa (C. PRESL) FRASER-JENK. & JERMY - Falscher Dornfarn **C4**
BL 4952/31 Rumburk WNW: Liščí / Röhrsdorf, Moor NO des Dorfes (Bauer, Härtel et al.).

Elatine triandra SCHKUHR - Dreimänniges Tännel **2**
LP 4748/41 Radeburg NO: Würschnitz NW, Massenbestand Mittelteich (Golde).

Elodea nuttallii (PLANCH.) H. ST. JOHN - Schmalblättrige Wasserpest
OE 5046/33 Freiberg, Erzwäsche am Ostbahnhof (Golde).
Erstnachweis im Gebiet um Freiberg und damit auch wieder aktuell für Sachsen nachgewiesen.

Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER - Rotbraune Stendelwurz, Braunrote Sitter **3**
OL 4951/33 Neustadt/Sachs. SSW: 4 blühende Exemplare am Rand eines Fichtenforstes (1999
Dietel).

Eriophorum latifolium HOPPE - Breitblättriges Wollgras **1**
OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf, quellige Wiese im FND „Hang an der Birkwiese“ (Ihl).

Erysimum marschallianum ANDRZ. ex DC. - Harter Schöterich
BL 4952/31 Rumburk WNW: Liščí / Röhrsdorf, an der Straße nach Severní / Hilgersdorf
(Bauer, Härtel et al.).

Festuca filiformis POURR. - Haar-Schwingel
OL 5154/32 Oybin, magere Rasenfläche am SSW-Hang des Schuppenberges, 455 m ü. NN
(Ihl). Die im Tiefland verbreitet und im Hügelland zerstreut auftretende Art besitzt
in der Oberlausitz nur wenige Vorkommen in Höhenlagen über 300 m.

Filago arvensis L. - Acker-Filzkraut 3; C3

BL 4952/31 Rumburk WNW: Liščí / Röhrsdorf, Straße nach Lipová / Hainspach (Bauer, Härtel et al.). Bis jetzt existierten aus dem Gebiet um Schluckenau nur historische Angaben aus dem 19. Jahrhundert.

Fumaria vaillantii LOISEL - Vaillants Erdrauch 2

OE 5149/12 Pirna S, Borna, Ruderalstelle Nähe Kirche (F. Müller).
Erstfund für das Osterzgebirge.

Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET - Acker-Goldstern 2

ML 4646/34 Großenhain WNW: Glaubitz-Sageritz, Kirchhof (Ihl).

Galium boreale L. - Nordisches Labkraut 2

OL 4555/32 Weißwasser SO: Tränke N, Massenbestand in Traubeneichenwald (Golde).
GP 4647/44 Großenhain ONO: Weißig a. R., aufgelassene Pfeifengraswiese im Niederraschütz (Hanspach).

Galium spurium L. subsp. *vaillantii* (DC.) GAUDIN – Hakenfrücht. Grünblütiges Labkraut 2

OL 4750/13 Kamenz W: Schwosdorf NW, Gerstenfeld an der Kleinen Poststraße, mehrfach (Otto).

Geum rivale L. - Bach-Nelkenwurz

OL 4655/24 Rothenburg NNO: Noes N, Quellmoor östlich der Flugplatzhäuser (Stolle). Eines der wenigen aktuellen Tieflandsvorkommen in der Oberlausitz.

Gladiolus imbricatus L. - Wiesen-Siegwurz 1

OL 4650/14 Kamenz NNW: Straßgräbchen, Waldstück nördlich des Ortes in Richtung Bernsdorf, 2 Exemplare (Hempel).

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH - Sand-Strohblume V

BL 4952/44 Rumburk NW: Rožany / Rosenhain, Schutthalde im Steinbruch Harrachov / Harrachsthal (Lust). Verschleppt?

Hieracium densiflorum TAUSCH – Dichtblütiges Habichtskraut 0

OE 5149/12 Pirna SSW: Borna, am alten Kalkofen (F. Müller und Bräutigam).

Hieracium iseranum (UECHTR.) ZAHN – Isergebirgs-Habichtskraut 3

OL 5153/22 Zittau W: Großschönau, Friedhof (Bräutigam).

Hieracium peleterianum MERÁT - Peletiers Habichtskraut 0a

EH 4746/41 Meißen NW: Diesbar, an Silikatfelsen beim „Roß“ (F. Müller).

Wiederfund für Sachsen!

Hieracium piloselliflorum N. & P. – Mausohrblütiges Habichtskraut 2

OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf, Ortsrand oberhalb der Kirche (Bräutigam).

Hieracium piloselloides VILL. – Florentiner Habichtskraut

ES 5150/41 Pirna SSO: Rosenthal, „Alte Tetschener Straße“ (Bräutigam).

OE 5247/42 Altenberg WSW: Hermsdorf, alter Marmorbruch, einzelne Pflanzen (Bräutigam).

OE 5248/14 Altenberg: ehemaliges Sportgelände nördlich des Galgenteiches, einzelne Pflanzen (Bräutigam).

Hieracium schmidtii TAUSCH - Blasses Habichtskraut **1**

EM 4948/31 Dresden-Plauen, Felsbänder über Felsenkellerbrauerei (Golde).
Neben dem bekannten Vorkommen bei Coschütz ein zweiter Standort im Plauenschen Grund.

Hyoscyamus niger L. - Schwarzes Bilsenkraut

OL 4555/33 Niesky N: Daubitz N, Gehöft südlich der Wolfsbrücke (G. u. M. Striese).
Eines der wenigen Oberlausitzer Tieflandsvorkommen.

Hypochaeris glabra L. - Kahles Ferkelkraut **2**

OL 4454/13 Bad Muskau N, am Rand der Straße nach Jämlitz beim ehem. Zollhaus, mehrere
Exemplare (Reimann).

Iris sibirica L. - Sibirische Schwertlilie **2**

OL 4454/14 Weißwasser O: NSG Braunsteich (Klenke).
Wiederfund einer um Weißwasser verschollen geglaubten Art.

Kickxia elatine (L.) DUMORT. - Spießblättriges Tännelkraut **1**

OL 4754/21 Niesky W: See SW, Ackerrand, 1 Exemplar (Stolle, confirm. P. Schütze). Die Art
war in der Oberlausitz segetal nach 1967 (Schwepnitz - Militzer) nicht mehr
beobachtet worden.
EH 4847/12 Meißen NO: Äcker bei Oberau (F. Müller). Fundortbestätigung.

Lamium montanum (PERS.) HOFFM. ex KABATH - Berg-Goldnessel

ES 5051/12 Sebnitz NW: Schönbach, Unger-Südhang (Otto u. Hahn).

Lilium martagon L. - Türkenbund-Lilie **3**

BL 5052/14 Rumburk WNW: Staré Knížecí / Altgrafenwalde, am Westfuß des Pirschken-
berges / Hrazený (Ritschel).

Luronium natans (L.) RAFIN – Froschkraut **1**

OL 4555/12 Potok (Polen) W, Kiesgrube (Golde).

Mercurialis annua L. – Einjähriges Bingelkraut

OL 4855/24 Görlitz: Nikolaifriedhof, südwestlicher Teil, Ruderalfläche (Vogel).

Meum athamanticum JACQ. - Gewöhnliche Bärwurz **C4**

BL 5052/42 Rumburk WSW: Staré Křečany / Altehrenberg, Wiesen am Ostfuß des
Wolfsberges / Vlčí hora (Bauer, Härtel et al.). Fundortbestätigung (Marschner ex
MARSCHNER et al. 1982-1985).

Molinia arundinacea SCHRANK - Rohr-Pfeifengras

OL 5154/24 Zittau SSO: Alt Hartau N, Weiße-Terrasse (Ihl).

Montia fontana L. subsp. *fontana* – Glanzsamiges Bach-Quellkraut

OE 5148/12 Dippoldiswalde O: Reinhardtsgrimma W, Wiesen am Fichtigt (Hardtke).
OE 5148/34 Dippoldiswalde S: Donschten, Quellflur (Hardtke).

Odontites vernus (BELLARDI) DUMORT. - Acker-Zahntrost **3; C2**

BL 5052/22 Rumburk NW: Šluknov / Schluckenau, Umgebung vom Lužní rybník /
Lindichteich (Bauer, Härtel et al.).

BL 5052/42 Rumburk WSW: Staré Křečany / Altehrenberg, am Ostfuß des Wolfsberges (Vlčí
hora) (Bauer, Härtel et al.).

Ophioglossum vulgatum L. - Gemeine Natterzunge 2
OE 5247/23 Altenberg SW: Hermsdorf, Kalkwerk (F. Müller et al.).


Petrorhagia prolifera (L.) P. W. BALL & HEYWOOD - Sprossende Felsennelke 2
OL 4549/14 Ruhland, zahlreich auf Ödland an der Bahnstrecke nordöstlich vom Bahnhof
(Reimann und Otto).

Potentilla heptaphylla L. - Rötliches Fingerkraut 1
EM 5049/12 Pirna NW: Straßenböschung zwischen Birkwitz und Söbrigen (F. Müller).
Bestätigung eines alten Vorkommens.

Pilularia globulifera L. - Gewöhnlicher Pillenfarn 1
OL 4754/34 Niesky SW: Prachenau, auf etwa 2 m² (Hanspach). Eines der wenigen
Oberlausitzer Hügellandvorkommen.

Rhinanthus alectorolophus POLLICH - Zottiger Klappertopf 2; C3
BL 4952/43 Rumburk NW: Šluknov W, Feldweg nordwestlich vom Ortsteil Cisařsky in
Richtung Špičák (Reimann).
BL 5052/22 Rumburk NW: Šluknov / Schluckenau, Lesní rybník / Waldteich und Umgebung
bei Karlovo údolí / Karlthal (Bauer, Härtel et al.).
OL 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf, ruderal am Westhang des Windmühlenberges (Knaut).

Rhinanthus angustifolius C. C. GMEL. s. l. - Großer Klappertopf 2
BL 5052/24 Rumburk W: Nové Křečany / Neuehrenberg, im Dorf (Bauer, Härtel et al.).



Karte 1 *Rubus chaerophyllus*


Rosa elliptica subsp. *subeglanteria* E. SCHENK - Elliptische Rose **1**
 EM 4948/33 Dresden-Plauen, am Hohen Stein (Hardtke).

Rorippa anceps (WAHLENB.) RCHB. - Niederliegende Sumpfkresse
 OL 4852/12 Bautzen W: Rattwitz (Friese). Bisher nur von Tröbigau (1950 Schütze);
 Hoyerswerda, Wasserburg-Mühle (1892 Barber) und Görlitz, Neißeufer (um 1900
 Barber) bekannt gewesen.

Rubus chaerophyllus SAGORSKI & SCHULTZE - Freudiggrüne Brombeere **Karte 1**
 OL 4650/31 Kamenz NW: Bulleritz (Hahn, det. Ranft).
 OL 4650/42 Kamenz N: Weißig S, Steinbruch (Hahn, det. Ranft).
 OL 4650/43 Kamenz WNW: Biehla S, Waldrand (Hahn, det. Ranft).
 Nordwestlichste Vorkommen in der Oberlausitz; im Oberlausitzer Tiefland bisher nur von
 Niesky (1915 Barber) bekannt gewesen.

Rubus mollis J. PRESL & C. PRESL - Weiche Haselblattbrombeere
 OL 4753/41 Bautzen NO: Baruth, Schafberg (Franke, det. Ranft). Nördlichstes Vorkommen in
 der Oberlausitz.

Rubus nemorosus HAYNE & WILDENOW - Hain-Haselblattbrombeere **R**
 OL 4755/21 Niesky W: Biehain W, Teichgebiet (Hahn, det. Ranft). Damit erstreckt sich das
 Vorkommen im Oberlausitzer Tiefland über zehn Viertelquadranten.



Karte 2 *Rubus scaber*

Rubus scaber WEIHE - Scharfe Brombeere **1** **Karte 2**
 OL 4951/34 Neustadt/Sachs. S: Unger, Nordhang (Otto, det. Ranft). Südwestliches aktuelles
 Vorkommen im Oberlausitzer Teilareal.

Rumex sanguineus L. - Blut-Ampfer
OL 5154/23 Zittau SW: Oybin S, am Goldbach unterhalb der Teufelsmühle, ca. 345 m ü. NN
(Ihl). Südlichstes und höchstgelegenes Vorkommen in der Oberlausitz.

Rumex × khekii RECH. PAT. [*R. crispus* × *R. obtusifolius* ssp. *obtusifolius*]
OL 4653/22 Niesky NW: Kies- und Schuttgrube zwischen Kringelsdorf und Reichwalde
(Piechotta, det. Gebauer).
Bisher erst die dritte im GLM belegte Beobachtung.

Saxifraga tridactylitis L. - Dreifinger-Steinbrech 2
OL 4852/23 Bautzen, Güterbahnhofsgelände, zu Tausenden (Friese).

Scirpus radicans SCHKUHR - Wurzelnde Simse 2
OL 4655/42 Rothenburg SO, Altwasser (Stolle).
OL 4656/33 Görlitz N: Kahlemeile NO, Altwasser (Stolle).
LP 4748/41 Radeburg NO: Würschnitz W, Ufer vom Niederteich (Golde).

Scorzonera humilis L. - Niedrige Schwarzwurzel 2
OL 4654/21 Niesky N.: Nieder-Prauske SW, Pfeifengras-Kiefernforst (Golde).

Scutellaria minor HUDS. - Kleines Helmkraut 1
GP 4647/44 Großenhain ONO: Weißig a. R., in den Gräben des Niederraschütz (Hanspach).

Senecio germanicus WALLR.
EH 5051/21 Sebnitz NO: Schönbach ONO, Straßenrand und Waldweg an der Straße Sebnitz-
Neustadt, mehrfach (Hahn und Otto, confirm. Bräutigam & Gebauer).

Senecio germanicus WALLR. subsp. *germanicus* - Jaquins Hain-Greiskraut
EH 5051/12 Sebnitz NW: Schönbach NO, Waldweg südlich „Langes Horn“ (Otto, confirm.
Bräutigam & Gebauer).

Sherardia arvensis L. - Ackerröte 2
OL 5154/13 Zittau WSW: Großschönau, Ackerrand am Nordwesthang vom Pocheberg, großer
Bestand (Ihl).

Silene × hampeana MEUSEL & WERNER [*S. dioica* × *S. latifolia*]
OL 5153/22 Zittau WSW: Großschönau W, Waldrand östlich Finkenhübel (Ihl).

Stellaria neglecta WEIHE - Auwald-Sternmiere
OE 5048/44 Pirna SW: Maxen, südl. Finkenfang (Hardtke).

Taraxacum oxyrhinum SAHLIN
OL 4554/32 Bad Muskau N, Parkstraße (Lubitz, confirm. Uhlemann). Dritter Nachweis in der
Oberlausitz!

Thalictrum lucidum L. – Glanz-Wiesenraute 2
OE 5048/42 Dresden SO, Wittgensdorf, Wiese westl. Kälberbusch (Hardtke).
OL 4654/21 Niesky N: Rietschen SW, Wiese in der Schöpsaue (Golde).

Triglochin palustre L. - Sumpf-Dreizack 1
OE 5049/32 Pirna S: Wiese in Ortslage Krebs (F. Müller). Fundortbestätigung (1983 Gnüchtel).

Utricularia stygia G. THOR – Dunkelgelber Wasserschlauch
OL 4653/24 Niesky WNW: Klitten O, vermoorte Stelle am Ostrand des Sumperteiches (Gebauer).

Die erst 1988 von G. THOR beschriebene nordische Art wurde auch in der Oberlausitz nachgewiesen (von A. Golde 1998 zunächst bei Klein Radisch und bei Kreba). Sie ist schwierig von anderen Wasserschläuchen, insbesondere von *U. ochroleuca*, zu unterscheiden. Hinweise bzw. fragliche Belege nimmt das GLM zur Überprüfung entgegen.

Vaccinium intermedium RUTHE - Bastard-Heidelbeere
OL 4851/13 Bischofswerda N: Schönbrunn NW, am Nordhang des Butterberges, ca. 280 m ü. NN (Friese). Höchstgelegenes Vorkommen in der Oberlausitz.

Verbascum lychnites L. - Mehligke Königskerze
OL 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf, ein Exemplar bei der Kaufhalle (Passig). Südlichstes - vermutlich nur vorübergehendes - Vorkommen in der Oberlausitz.

Verbascum × *incanum* GAUDIN [*V. nigrum* × *V. lychnites*]
OL 4549/13 Ruhland, Güterbahnhof, 1 Exemplar (Reimann u. Otto).

Veronica scutellata L. - Schild-Ehrenpreis **3; C4**
BL 5052/23 Rumburk W: Brtníky / Zeidler, Wiesen westlich vom Ptačí vrch / Lichtenberg (Bauer, Härtel et al.).

Viburnum lantana L. - Wolliger Schneeball
EH 5049/13 Pirna SW: Robisch bei Dohna, über Plänerkalk im Eichen-Hainbuchenwald (F. Müller, Wiepning).

Dieses Vorkommen gibt Rätsel auf. Für ein indigenes Vorkommen sprechen der Standort und die Begleitflora (*Peucedanum cervaria*, *Geranium sanguineum*), dagegen, dass der Robisch seit 80 Jahren regelmäßig begangen und erforscht wird.

Viscum album L. subsp. *album* - Laubholz-Mistel
OL 4550/14 Hoyerswerda WNW: Lauta Dorf S, auf *Quercus rubra* (Stolle). In der Oberlausitz bisher noch nie auf Eichen beobachtet.

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Amaranthus blitum L. – Aufsteigender Fuchsschwanz
OL 4653/32 Niesky NW: Kaschel, Schuttstelle am Weg zu den Kascheler Teichen (Piechotta).

Anaphalis margaritacea (L.) A. GRAY- Perlblume
LP 4949/12 Dresden-Bühlau NO: Dresdner Heide, Alte Eins beim Schwarzwasser (Töppich).

Avena fatua L. - Flug-Hafer
OL 4752/11 Bautzen NNW: Neudorf bei Neschwitz NO, zahlreich in einem Sommergerstenfeld (Otto).

Cicerbita macrophylla (WILLD.) WALLR. - Großblättriger Milchlattich
BL 4952/33 Rumburk WNW: Lipová / Hainspach, Schloßpark (Bauer, Härtel et al.). Fundortbestätigung (Steudtner et Marschner ex MARSCHNER et al. 1982-1985).

BL 4952/31 Rumburk WNW: Liščí / Röhrsdorf, im Dorf (Bauer, Härtel et al.). Fundortbestätigung (Militzer ex MARSCHNER et al. 1982-1985).

Cruciata glabra (L.) EHREND. - Kahles Kreuzlabkraut
BL 4952/42 Rumburk NW: Království / Königswalde, im ehem. Dorf Fukov / Fugau und an der
Straße Království - Fukov (Bauer, Härtel et al.).

Erstnachweis für das Schluckenauer Hügelland.

Chenopodium pratericola RYDB. - Schmalblättriger Gänsefuß
OL 4549/13 Ruhland, Bahnhofsgelände, mehrfach (Reimann u. Otto). Bisher nur zweimal in
der Oberlausitz nachgewiesen: 4551/44 Knappenrode (1933 Militzer u. Nerlich -
GLM), 4551/32 Hoyerswerda (1933 Militzer- GLM).

Chinodoxa luciliae BOISS. – Schneestolz
ML 4646/34 Großenhain WNW, Sageritz S, Gutsark (Ihl).

Cuscuta campestris YUNCK. – Amerikanische Grobseide
OL 4654/12 Niesky W: Nappatsch, Massenbestand auf *Lupinus angustifolius* (Bräutigam).

Eragrostis cilianensis (ALL.) VIGNOLO ex JANCH. - Großes Liebesgras
OL 4755/41 Görlitz NNW: Erdaufschüttung in der Deponie Kunnersdorf (Gebauer, det. Gutte).

Inula helenium L. - Echter Alant
OL 5154/12 Zittau SW: Bertsdorf, 1 große Staude am Südhang vom Seidelsberg (Ihl).

Matthiola lunata DC
OL 4852/13 Bautzen SW: Brösang, Bauschutt-Ablagerung (Friese, det. Bräutigam).

Mimulus guttatus DC. - Gefleckte Gauklerblume
OL 4655/24 Rothenburg NNO: Noes N, Neißeufer an ehemaliger Brücke östlich vom
Galgenberg (Stolle). Die Art scheint sich an der Neiße auszubreiten (OTTO et al.
1999).

Oxalis dillenii JACQ. - Dillenius' Sauerklee
OL 4551/42 Hoyerswerda O, Straßenrand im Industriegelände (Piechotta).

Origanum vulgare L. subsp. *prismaticum* GAUDIN - Wintermajoran
OL 4852/23 Bautzen, Ödland westlich der Straße nach Singwitz (Friese).

Physalis peruviana L. - Peruanische Blasenkirsche, Kapstachelbeere
OL 4755/41 Görlitz NNW: Kunnersdorf NNO, Ruderalstelle westlich vom Kalkbruch
(Gebauer).
OL 4755/43 Görlitz NNW: Kunnersdorf NO, auf dem Gelände der neuen Mülldeponie (Franke
u. Gebauer).

Portulaca oleracea L. - Europäischer Portulak 3
OL 4549/23 Ruhland OSO: Schwarzbach, Bahngelände (Reimann u. Otto).

Potentilla intermedia L. – Mittleres Fingerkraut
OL 4655/43 Niesky ONO: Horka, Güterbahnhof (Gebauer).

Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER - Großblütige Braunelle 0
OL 4852/11 Bautzen W: Dreistern, drei Exemplare an einem Wiesenrand (Friese).

Salvia verticillata L. – Quirlblütiger Salbei
OL 4653/14 Niesky WNW: Klitten-Jahmen W, Ruderalfläche beim Aussichtspunkt Bärwalde
am Tagebaurestloch südlich von Boxberg (Gebauer).

Senecio inaequidens DC. – Schmalblättriges Greiskraut

- LP 4850/13 Kamenz SSW: Großröhrsdorf, Bahngleise (B. Müller).
EH 4948/33 Dresden-Plauen, Felsenkeller (Ihl).
EH 4948/14 Dresden, Menageriestraße (D. Schulz, Ihl).
EH 4949/33 Dresden-Kleinzschachwitz, Bahnanlagen (B. Müller).
OE 5046/33 Freiberg, Ostbahnhof im Gleisschotter (seit 1999, Golde).
EH 5049/11 Heidenau, Bahnhof (B. Müller).
ES 5050/44 Bad Schandau, Bahnhof (B. Müller).
Die Art ist weiter in stürmischer Ausbreitung

Silene armeria L. - Nelken-Leimkraut

- LP 4748/21 Königsbrück SO: Sacka NW, Acker südl. Steinigteich (F. Müller)

Sorghum halepense (L.) PERS. - Wilde Mohrenhirse

- OL 4755/43 Görlitz NNW: Kunnersdorf NO, Mülldeponie (Franke und Gebauer).
OL 4852/21 Bautzen, Erdaufschüttung (Friese).

Spartina pectinata LINK (Poaceae) – Prärie-Bandgras

- OL 4653/23 Niesky NW: Schuttstelle am Weigersdorfer Fließ zwischen Jahmen und Dürrbach (Gebauer).

Erstnachweis im Gebiet.

Tanacetum balsamita L. – Balsamkraut

- OL 4755/44 Görlitz NNW: Bahnhof Charlottenhof, Bahndammböschung beim ehemaligen Bahnwärterhaus (Gebauer).

Viola suavis M. BIEB. - Blaues Veilchen, Kornblumen-Veilchen

- OL 4852/12 Bautzen, Sprechhang an der Neuen Wasserkunst (Friese).

Berichtigung

Fumaria rostellata KNAF – Schnabel-Erdrauch

- Die Angabe in den "Floristischen Beobachtungen 1997 und 1998..." (OTTO et al. 1999):
OL 5054/24 Zittau N: Schanzberg bei Oberseifersdorf (Peukert)
bezieht sich auf *Fumaria vaillantii* (rev. P. Gebauer).

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung enthält:

1. den Erstnachweis von *Spartina pectinata*;
2. Verbreitungskarten von *Rubus chaerophyllus* und *Rubus scaber*;
3. neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, unter denen *Alchemilla crinita*, *Alchemilla plicata*, *Asperula cynanchica*, *Carex appropinquata*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Chenopodium pratericola*, *Elodea nuttallii*, *Fumaria vaillantii*, *Potentilla heptaphylla*, *Taraxacum oxyrrhinum* und *Utricularia stygia* besonders bemerkenswert sind;
4. eine Berichtigung zu *Fumaria rostellata*.

Literatur

- HARDTKE, H.-J. & A. IHL (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen des Freistaates Sachsens. - Hrsg.: Sächs. Landesamt für Umwelt u. Geologie, 806 S.
- HOLUB J. & F. PROCHÁZKA (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic – Preslia, Praha, 72: 187-230
- MARSCHNER H. et al. (1982-1985): Květena Šluknovského výběžku. - Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 12 (1982): 45-108, 13 (1983): 25-61, 14 (1985): 41-84
- OTTO, H.-W., I. DUNGER & H.-J. HARDTKE (1985): Floristische Beobachtungen 1983 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **58**, 12: 3-16
- , P. GEBAUER, H. HÄRTEL & H.-J. HARDTKE (1996): Floristische Beobachtungen 1997 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **6**: 57-82
- , -, H.-J. HARDTKE & K. MORÁVKOVÁ (1999): Floristische Beobachtungen 1997 und 1998 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **7/8**: 61-94
- SCHULZ, D. (1999): Rote Liste Farn- und Samenpflanzen. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 1999 (Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie) Dresden
- THOR, G. (1988): The genus *Utricularia* in the Nordic countries, with special emphasis on *U. stygia* and *U. ochroleuca* - Nord. J. Bot. **8** (3): 213-225
- WISSKIRCHEN, R. & H. HAEUPLER (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. - Stuttgart Ulmer

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
01877 B i s c h o f s w e r d a

